



Ридомип Голд[®]
Р ВГ

syngenta[®]




**Прав избор
за многу
проблеми !**

Прав избор за многу проблеми!


Активна материја 2% Мефеноксам - Металаксил-М + 14,19 % бакарен оксихлорид

Ридомил Голд Р е нова формулација со системично, куративно и контактено делување. **Ридомил Голд Р** е комбинација од системичниот изомер Мефеноксам и бакар оксихлорид. Бакарниот оксихлорид во **Ридомил Голд Р** е во согласност со новите законски прописи и тенденции при Европската унија, при што е добиен продукт со висока ефикасност и кратка каренца. Целосното системично делување на мефеноксам и контактното делување на бакарниот оксихлорид придонесуваат за широка употреба во голем број на култури, со одлично делување на најзначајните болести во секакви услови.


По брза абсорпција на Мефеноксам (Металаксил-М) - во споредба со конкурентните активни материји, 6 часа после апликација



Фунгицид 1



Фунгицид 2




Мефеноксам
Ридомил Голд

Активната материја со силно акропетално движење го прати новиот пораст



Ридомил Голд Р има висока ефикасност кон причинителот на пламеница и алтернариа кај голем дел на градинарски култури и винова лоза. Брзата апсорпција и силното системично делување осигурува целосна заштита, како на третираните делови, така и на новиот вегетативен прираст кој се развил после третманот. Новата формулација која е во **Ридомил Голд Р** му овозможува голем период на употреба - односно при целиот вегетативен живот на културите каде истиот се применува. Ридомил Голд Р со својата нова формулација, се карактеризира со врвна ефикасност, одлично контактено и системично делување, продолжен и сигурен ефект од почеток до крајните фази.

Мефеноксам со високото системично делување го заштитува и прати новиот прираст, кои што се развива после третирањето



Предности

- Брза апсорпција - без опасност од измивање
- Контактено, трансламинарно и високо системично делување
- Продолжена заштита
- Го прати новиот пораст
- Единствен куративен и сигурен ефект
- Нова напредна формулација
- Единствената формулација на бакарен оксихлорид - придонесува до редуцирано количество на бакар во согласност со Европските тенденции
- Ефикасен и стабилен при секакви услови

Ридомил Голд Р е создаден од уникатна нова формулација



Генеричен продукт

Ридомил Голд

После една минута, без мешање



Пламеница



Каде и кога имаме најголема корист од **Ридомил Голд Р**

Време на употреба кај винова лоза:



Заштита во почетните фази на виновата лоза до прецветување:

- Брзо навлегување во лисјата и дршката на гроздот
- Целосна заштита на новиот прираст - високата системичност го прати самиот прираст
- Долг период на превентивна заштита како и 72 часа куративно делување - во случај на закаснета апликација
- Високо ниво на честици на бакарен оксихлорид благодарјеќи на новата напредна технологија
- Широк спектар на делување, покрај одличното делување на причинителот на пламеница, преку контактната активна материја силно делува на црна дамкавост и останатите болести

Употреба на **Ридомил Голд Р** од зрно грашок до зреење:

- Го прати и штити новиот прираст, до колку дојде до повреди на растението успешно ги затвара раните
- Комбинацијата од двете активни материји придонесува леторастите да станат поотпорни на неповолни услови
- Го прати порастот на зрното
- Делува одлично на касни инфекции
- Препорачлив и единствен системик на база на бакар кој може да се употребува во покасните фази
- Употреба се до зреење
- **Каренца 20 дена**

Култура	Болести	Доза	Потрошувачка на вода	Напомена, Каренца
Винова лоза	Пламеница (<i>Plasmopara viticola</i>)	5 kg/ha	600 – 1000 l/ha	20 дена; максимум 4 апликации



Симптоми домат



Симптоми зелка



Симптоми лиснати култури

Употреба на Ридомил Голд Р во градинарски култури

- **Ридомил Голд Р** има широка примена во многу градинарски култури
- **Ридомил Голд Р** - има широк опсег на делување против најважните болести - пламеница и црна дамакавост
- Покрај делувањето на пламеница и црна дамакавост - бакарниот елемент во **Ридомил Голд Р** делува споредно и на останати болести
- Се употребува од почеток на вегетацијата се до зреење
- На почеток на вегетацијата го прати порастот и претставува сигурна заштита во почетните фази на развој, како предуслов на здрав насад
- Претставува сигурен партнер за заштита од пламеница и црна дамакавост, во фазите кога доаѓа до целосно нараснување на растенијата односно во подоцнежните фази поради кратката каренца

Практични информации

- Лесен за употреба - брза растворливост, не ствара талог, не создава прашење
- Одлична селективност и делување во фази во кои останатите комбинирани системични продукти со бакар не се употребуваат
- Го контролира вегетативниот прираст

Култура	Болести	Доза	Потрошувачка на вода	Напомена, Каренца
Домат, лубеници, дињи, кромид на отворено и во оранжерии	Пламеница (<i>Phytophthora infestans</i>), црна дамакавост (<i>Alternaria spp.</i>)	5 kg/ha	300 – 600 l/ha	3 дена каренца; максимум 4 апликации
Зелкови култури, марула, цикорија, зачински растенија на отворено	Пламеница (<i>Perenospora spp.</i>), (<i>Bremia spp.</i>) и црна дамакавост (<i>Alternaria spp.</i>)	5 kg/ha	300 – 600 l/ha	10 дена; максимум 4 апликации
Компир, зелкови култури, марула, цикорија, зачински растенија во оранжерии, салати	Пламеница (<i>Perenospora spp.</i>), (<i>Bremia spp.</i>) и црна дамакавост (<i>Alternaria spp.</i>)	5 kg/ha	300 – 600 l/ha	14 дена каренца; максимум 4 апликации
Карфиол, Брокула	Пламеница (<i>Perenospora spp.</i>), (<i>Bremia spp.</i>) и црна дамакавост (<i>Alternaria spp.</i>)	5 kg/ha	300 – 600 l/ha	14 дена каренца; максимум 4 апликации

Најважно за Ридомил Голд Р

- Системичен продукт кој го прати новиот прираст.
- Комбинација од системично и контактено делување во голем број култури за најзначајните болести.
- Едновремено делување кај градинарските култури за најзначајните болести како пламеница, алтернариа, како и споредно на останати болести.
- Новата формулација, кратката каренца, високата ефикасност при секакви услови овозможува **Ридомил Голд Р** да има голем период на употреба - од почетните фази се до берба во зависност од културата.
- Високата ефикасност е подржана и со силно куративно делување, односно до 72 часа од инфекцијата.
- Единствен комбинирани продукт со бакар по најновите Европски барања кој може да се употребува се до крајните фази.
- Каренца од 3 до 20 дена во зависност од културата.
- Идеален за превентивна, куративна и сигурна заштита при касни инфекции.

Syngenta:

Координатор за продажба
во Македонија

Благој Сиваков

blagoj.sivakov@syngenta.com

Тел. +389 70 328 587

www.macedonia.syngenta.com

Дистрибутер

ХОЛМА, Струмица

info@holma.com.mk

www.holma.com.mk

Тел. +389 34 349 290

Моб. +389 70 393 900

Струмица, Валандово, Гевгелија, Радовиш

Кирчо Трајков +389 72 319 865

Неготино, Кавадарци, Градско

Ристо Коцев + 389 72 319 867

Прилеп, Битола, Ресен, Охрид, Струга, Кичево

Јован Станојковиќ +389 72 319 869

Скопје, Куманово, Гостивар, Тетово

Цветан Петковски + 389 70 315 165

Штип, Кочани, Велес, Пробиштип,

Св.Николе, Винаца, Делчево

Петар Танчев +389 75 406 417

Кирил Василев +389 76 303 050



Користете средства за заштита на растенијата на безбеден начин за луѓето, животните и животната средина. Пред примена на производите обавезно прочитајте ја етикетата и упатството на паковањето. За подетални информации, препораки и стручна помош, обратете се на нашата стручна служба. Оваа брошура е од информативен карактер. Не можеме да сносиме одговорност за евентуални штампарски грешки. Производителот и неговиот застапник не можат да сносат одговорност за штети кој се предизвикани од неправилна употреба, складирање, транспорт и примена на истите, како и поради смалување на осетливоста или отпорноста на штетните организми.