



Aktivna materija	125 g/L difenokonazol +15 g/L ciflufenamid
Formulacija	koncentrat za disperziju (DK), žute boje
Pakovanje	250 ml


Usev	Za kontrolu	Doza primene	Vreme primene	Karenca
Krastavac	pepelnica <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , crna pegavost lista <i>Alternaria cucumerina</i> , crna trulež stabla <i>Didymella bryoniae</i> , krastavost plodova <i>Cladosporium cucumerinum</i> , antraknoza ploda <i>Colletotrichum lagenarium</i>	100 ml na 10 ari	Preventivno ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja	3 dana
Dinja	pepelnica <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , crna pegavost lista <i>Alternaria cucumerina</i> , gumozna plamenjača stabla <i>Didymella bryoniae</i> , krastavost plodova <i>Cladosporium cucumerinum</i>			
Lubenica	pepelnica <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , crna pegavost lista <i>Alternaria cucumerina</i> , crna trulež stabla <i>Didymella bryoniae</i> , krastavost plodova <i>Cladosporium cucumerinum</i>			
Paradajz	pepelnica <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe lycopersici</i> , crna pegavost <i>Alternaria solani</i> , plesnivost lista <i>Fulvia fulva</i>			
Patlidžan	crna pegavost <i>Alternaria solani</i> , plesnivost lista <i>Fulvia fulva</i>			
Paprika	pepelnica <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe lycopersici</i> , crna pegavost <i>Alternaria solani</i> , plesnivost lista <i>Fulvia fulva</i>			
Jagoda	pepelnica <i>Sphaerotheca macularis</i> , antraknoza ploda <i>Colletotrichum acutatum</i> , lisna pegavost <i>Mycosphaerella fragariae</i> , crna pegavost ploda <i>Alternaria sp.</i>			

Posebne napomene: CYDELI® Top je u skladu sa programima integralnog upravljanja štetnim organizmima (IPM). Nije štetan za korisne insekte koji se koriste u staklenicima, kada se koristi u skladu sa uputstvom za primenu. CYDELI® Top se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše dva puta u dinjama, lubenicama, krastavcu, tikvicama, paprici i plavom patlidžanu, dok se u jagodama i paradaju može primeniti jednom u polju, a dva puta u zatvorenom prostoru. Interval između dva tretiranja je 10 dana.

CIDELY® Top može da se kombinuje sa sledećim proizvodima:

RIDOMIL Gold	CA
REVUS Top	C
ACTARA	C
KARATE Zeon	C
VERTIMEC	C
AFFIRM	C
VOLIAM Targo	C

CA	Kompatibilno sa mešanjem
C	Kompatibilno



- CIDELY® Top je inovativni fungicid, koji obezbeđuje proizvođačima:
- veću kontrolu bolesti, čime se smanjuje njihov uticaj na prinos
 - dug postfekat (up to 14 days), koji produžava intervale između pojedinačnih tretiranja
 - jako zaštitno i lekovito dejstvo za veću fleksibilnost u primeni
 - širok spektar, koji smanjuje potrebu za kombinovanjem sa drugim proizvodima i olakšava korišćenje fungicida
 - nivo ostataka (MRL) koji omogućava slobodniju prodaju kratko vreme nakon berbe
 - bez rizika od pojave rezistentnosti zbog novog mehanizma delovanja



Uvek pobednik protiv pepelnice

Ako ne verujete
nama, verujte
svojim očima



Cidely® Top

syngenta.

Cidely® Top

syngenta.

SYNGENTA AGRO d.o.o.
Airport City Belgrade
Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd
tel: +381 11 3129981, fax: +381 11 3129980
www.syngenta.rs

Ovaj prospakt je informativnog karaktera i sadži opšte informacije. Pre primene proizvoda obavezno pročitati uputstvo za upotrebu na pakovanju preparata. Proizvođač ne može snositi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili primenom preparata, kao i usled pojave smanjene osjetljivosti ili otpornosti štetnih organizama. Za detaljnije informacije, preporuke i stručnu pomoć обратите se stručnoj službi zastupnika.



Profil proizvoda

Novi Syngenta fungicid za kontrolu osnovnih bolesti kod krastavaca, lubenica, dinja, paradajza, jagoda.

CIDELY® Top je nova kombinacija dve aktivne materije sa jedinstvenim mehanizmom delovanja i sa visokom efikasnošću protiv svih sojeva pepelnice čak i onih, koji su otporni na triazole.

CIDELY® Top se odlikuje svojim kombinovanim zaštitnim i lekovitim dejstvom protiv osnovnih gljivičnih patogena.

CIDELY® Top je specijalno razvijen za kontrolu osnovnih bolesti vrežastih useva, krastavca, lubenice i dinje.




Prednosti

- Dvostruki mehanizam delovanja
- Visoka efikasnost
- Širok spektar
- Dug postefekat
- Kratka karenca
- Bez rizika od rezistentnosti

Jedinstveni fungicid na tržištu, registrovan protiv 5 osnovnih bolesti kod krastavca, lubenice i dinje

Povećana efikasnost, novi mehanizam delovanja



Difenokonazol

Ciflufenamid

Mehanizam delovanja

CIDELY® Top je formulisan na bazi dve aktivne materije

Difenokonazol:

- Zaustavlja razvoj gljivice za vreme njenog prodiranja u list i obrazovanje haustorija


Ciflufenamid:

- Inhibira obrazovanje apresorija
- Stopira razvoj i rasprostranjenost micelije
- Sprečava sporulaciju gljive

Kretanje u biljci



Gde CIDELY® Top napada patogena tokom njegovog razvoja?



Način primene

Primena **CIDELY® Top** trebalo bi da započne početkom vegetacije, pre pojave oboljenja (preventivno). Tretiranje biljaka obavlja se lisno u dozi 100 ml/10a. Preporučuje se da se ne primenjuje više od 2 tretiranja po sezoni. Minimalni interval između pojedinačnih primena je 10-14 dana. Radni rastvor, koji bi trebalo da se koristi prilikom primene je 30-100 L na 10 ari. Upotreba ili potrošnja poljoprivrednih proizvoda – 3 dana nakon poslednjeg prskanja.

Kompatibilnost sa oprašivačima

CIDELY® Top je bezopasan za osnovne, korisne insekte i oprašivače

Kretanje - translaminarno, vertikalno i horizontalno

(*Amblyseius swirskii*, *Orius laevigatus*, *Encarsia formosa*, *Nesidiocoris tenuis*, *Eretmocerus mundus*).

Rezultati ogleda kod suzbijanja pepelnice krastavca


Vreme primene

Posle 7 dana

Cidely® Top

Fungicid 1

Fungicid 2



Efikasnost **CIDELY® Top** protiv pepelnice, u poređenju sa druga dva fungicida, 7 dana posle tretiranja
Syngenta Bulgaria.